

HyperCVAD/MA 療法

【癌種】 急性リンパ球性白血病

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 HyperCVAD と MA を交互に 4 セット

HyperCVAD 療法

薬剤	投与時間	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
シクロホスファミド (エンドキサン®) 300mg/m ² 1 日 2 回	2 時間	↓ ↓	↓ ↓	↓ ↓				
ドキシソルビシン (アドリアシン®) 50mg/m ²	30 分				↓			
ビンクリスチン (オンコビン®) 1.4mg/m ² ※最大 2mg	5 分				↓			
デキサメタゾン 40mg/body	内服		→					

薬剤	投与時間	8 日目	11 日目	14 日目	21 日目
ビンクリスチン (オンコビン®) 1.4mg/m ² ※最大 2mg	5 分	↓			
デキサメタゾン 40mg/body	内服		→		

MA 療法

薬剤	投与時間	1 日目	2 日目	3 日目	21 日目
メソトレキセート ※1g/m ²	※24 時間	↓			
シタラピン (キロサイド®) 3g/m ² 1日2回	72 時間		↓ ↓	↓ ↓	

※メソトレキセートは最初の 2 時間で 200mg/m² を投与し、その後 22 時間かけて 800mg/m² を投与する。

【注意点】

悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、血管炎、脱毛、出血性膀胱炎、心機能障害、肺障害、意識障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
