
EC 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 術後補助

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
エピルビシン	90mg/m ²	15 分	↓		
シクロホスファミド (エンドキサン®)	600mg/m ²	30 分	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、心機能障害、出血性膀胱炎、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

wPTX 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 術後補助

【1 コース期間】 7 日

【コース数】 12 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	7 日目
パクリタキセル	80mg/m ²	1 時間	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

triweekly HER 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 術後補助

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 17～18 コース (1 年間)

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
トラスツズマブ (ハーセプチン®)	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2 回目以降)	※90 分	↓		

※1 回目投与時に特に問題なければ、2 回目以降は 30 分まで短縮可能。

【注意点】

- ・ infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。
-

wPTX±BV 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	～	28 日目
ベバシズマブ (アバスチン®)	10mg/kg	※90 分	↓		↓		
パクリタキセル	90mg/m ²	1 時間	↓	↓	↓		

※1 回目投与時に特に問題なければ、2 回目は 60 分、3 回目以降は 30 分まで短縮可能。

【注意点】

- ・ 悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・ infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Pertuzumab+Trastuzumab±DOC 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
ペルツズマブ (パージェタ®)	840mg/body(初回) 420mg/body(2 回目以降)	30 分	↓		
トラスツズマブ (ハーセプチン®)	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2 回目以降)	※90 分	↓		
ドセタキセル (タキソテール®)	75mg/m ²	60 分	↓		

※1 回目投与時に特に問題なければ、2 回目以降は 30 分まで短縮可能。

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。
-

T-DM1 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
トラスツズマブ エムタンシン (カドサイラ®)	3.6mg/kg	※90 分	↓		

※初回投与が問題なければ、2 回目以降は 30 分に短縮可能。

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
 - ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Elibulin 単独療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	～	21 日目
エリブリン (ハラヴェン®)	1.4mg/m ²	5 分	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Palbociclib+Letrozole 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日（イブランス[®]は 21 日間内服し、7 日間休薬）

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
パルボシクリブ (イブランス [®])	125mg/day 1 日 1 回	※連日内服	→		
レトロゾール (フェマーラ [®])	2.5mg/day 1 日 1 回	連日内服	→		

薬剤名	22 日目	～	28 日目
パルボシクリブ (イブランス [®])	休薬	～	休薬終了
レトロゾール (フェマーラ [®])	→		

【注意点】

- ・ infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Palbociclib+flvestant 療法

【癌種】 乳癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日（イブランス[®]は 21 日間内服し、7 日間休薬）

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	15 日目	21 日目
パルボシクリブ (イブランス [®])	125mg/day 1 日 1 回	連日内服	→		
フルベストラント (フェソロデックス [®])	500mg/body	皮下注	↓	※ ↓	

薬剤名	22 日目	～	28 日目
パルボシクリブ (イブランス [®])	休薬	～	休薬終了
フルベストラント (フェソロデックス [®])			

※2 コース目以降は 15 日目のフェソロデックス[®]は無し。

【注意点】

- ・ infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔、心機能障害などの有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部
TEL 098-932-1110 (代表)
FAX 098-923-2134 (薬剤部)