
CDDP+5FU 療法

【癌種】 食道癌

【区分】 術前補助

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 2 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目
シスプラチン (ランダ®)	80mg/m ²	90 分	↓			
フルオロウラシル (5-FU®)	800mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓

薬剤名	5 日目	~	28 日目
シスプラチン (ランダ®)			
フルオロウラシル (5-FU®)	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

CDDP+5FU 療法

【癌種】 食道癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 28 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目
シスプラチン (ランダ®)	80mg/m ²	90 分	↓			
フルオロウラシル (5-FU®)	800mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓

薬剤名	5 日目	～	28 日目
シスプラチン (ランダ®)			
フルオロウラシル (5-FU®)	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

DOC 単独療法

【癌種】 食道癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
パクリタキセル (タキソテール®)	70mg/m ²	60 分	↓		

【注意点】

・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。

wPTX 療法

【癌種】 食道癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 49 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	8 日目	15 日目	22 日目
パクリタキセル (タキソテール®)	100mg/m ²	60 分	↓	↓	↓	↓

薬剤名	29 日目	36 日目	～	49 日目
パクリタキセル (タキソテール®)	↓	↓		

【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、腎機能障害、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
-

Nivolumab 単独療法

【癌種】 食道癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 14 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	14 日目
ニボルマブ (オプジーボ®)	240mg/body	1 時間	↓		

【注意点】

- ・ 間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象 (irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部

TEL 098-932-1110 (代表)

FAX 098-923-2134 (薬剤部)