

---

## トーリセル療法

---

【癌種】 腎細胞癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 7 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	7 日目
テムシロリムス (トーリセル ®)	25mg/body	30 分～1 時間	↓		

【注意点】

- ・ 悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
  - ・ infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## オプジーボ単独療法

---

【癌種】 腎細胞癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 14 日

【コース数】 なし

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	14 日目
ニボルマブ (オプジーボ®)	240mg/body	1 時間	↓		

【注意点】

- ・ 間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象 (irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## オプジーボ・ヤーボイ併用療法

---

【癌種】 腎細胞癌

【区分】 進行再発

【1 コース期間】 21 日

【コース数】 4 コース

薬剤名	投与量	投与時間	1 日目	～	21 日目
ニボルマブ (オプジーボ®)	240mg/body	30 分	↓		
イピリムマブ (ヤーボイ®)	1mg/kg	30 分	↓		

※5 コースからはオプジーボ単独療法へ移行

### 【注意点】

- ・間質性肺炎、甲状腺機能異常、大腸炎、1 型糖尿病などの免疫関連有害事象 (irAE)といわれる有害事象が起こる可能性があります。
-

---

## スニチニブ療法

---

【癌種】腎細胞癌

【区分】進行再発

【1コース期間】42日（スーテント®は28日間内服、14日間休薬）

【コース数】なし

薬剤名	投与量	投与時間	1日目	～	28日目
スニチニブ (スーテント®)	50mg/day 1日1回	連日内服	→		

薬剤名	29日目	～	42日目
スニチニブ (スーテント®)	休薬	～	休薬終了

### 【注意点】

- ・悪心、嘔吐、下痢、アレルギー反応、食欲低下、倦怠感、口内炎、味覚障害、末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などの有害事象が起こる可能性があります。
- ・infusion reaction、高血圧、蛋白尿、消化管穿孔などの有害事象が起こる可能性があります。

---

その他、不明な点があれば中部徳洲会病院薬剤部に連絡してください。

中部徳洲会病院 薬剤部

TEL 098-932-1110（代表）

FAX 098-923-2134（薬剤部）

